

紅腿象龜

- ▶ 紅腿象龜（學名：*Chelonoidis carbonaria*，英文名：Red-footed tortoise）是來自南美洲北部的一種受歡迎的寵物龜。牠們是中型陸龜，一般成龜平均長度為30厘米（12英寸），亦可以達到40厘米（16英寸）。牠們有深色麵包形的背甲，四肢及頭部的顏色很鮮豔，大概從淺黃色至暗紅色。而紅腿象龜在不同地區也有不同的亞種，而來自亞馬遜流域的黃腿象龜與紅腿象龜有著密切關係。



名稱[編輯]

紅腿象龜有許多名字：紅腿陸龜、紅腳龜和稀樹草原龜等，以及在部分當地起的名稱，如 carumbe、karumbe，在當地而言，這意味著「慢慢地移動」（巴西，巴拉圭），wayapopi或morrocoy（委內瑞拉，哥倫比亞），以及japuta和jabuti piranga（巴西，阿根廷）。

成年雄性紅腿象龜的腹甲



紅腿象龜頭部特寫

成年紅腿象龜的甲殼通常是一個細長的橢圓形，兩側平行，但雄性的兩側會向內灣。牠們的背甲高高隆起，而且十分光滑，而每一塊盾甲的中間是淺黃色，而四周是黑色或深褐色。頸部並不像其他陸龜，並沒有鱗甲。而生長紋在生長時期會十分明顯，但大部分龜的生長紋都會隨著年齡增長而變得光滑。



地區差異

- ▶ 生活在不同地區的群族會被分類成不同的群體，不同的學者亦會分析紅腿象龜地理分布。彼得·普里查德公認的並有7個種類，但由馬里奧·巴爾加斯·**Rameriz**等人的DNA研究，已經確定了有5個亞種。
- ▶ 最明顯的區別是亞馬遜河流域的北部或南部的品種。「北」部亞種都看起來非常像是模範，主要由外殼、頭、四肢著色方面得知。而亞馬遜以南的亞種則有一著特別的腹甲圖案，肘部內側有著刺狀物。

生態和行為

- ▶ 紅腿象龜棲息地氣候變化並不大，很少太熱和太冷的氣候，所以龜隻大多不會進入任何形式的休眠，所以往往能整天活動。莫斯科維茨的研究中，烏龜最為活躍的時候為下午**3:00**後。在的南部地區，氣候會較極端、乾燥，因此大多數龜隻會夏眠，而當食物短缺，他們可能會暫時東遷。
- ▶ 很多龜隻在一天內會有大量時間休息，一般花**50%**以上時間作日照、休息。他們時常休息，甚至在吃完一頓大餐後可以休息**5-10**天。曾經有紀錄一隻紅腿象龜在一個月內都停留在相同的位置。休息中的龜隻可以完全不移動，令枯枝落葉在其身上累積，而白蟻亦已在紅腿象龜的甲殼上不斷走過。

玢玢!!!

